
glob. MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 75, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 250, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.33, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.33, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1
MSE
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1
MSE
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1
MSE
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.55, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.55, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of Poisson cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 1.4
MSE
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
μ


glob. MSE of NB coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


glob. MSE of NB cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


low. 25% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB coh
α = 0.8, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ


up. 10% MSE of NB cca
α = 0.8, T = 2500, I_X = 2.4
MSE
μ